

Protocol

Bijtwenden



Anamnese (subjectief)

Algemene vragen

Wat, waar, hoe, wanneer en waarom?

- Wat is er gebeurd?
- Wanneer is de wond ontstaan?

Specifieke vragen

- Bent u door een mens of dier gebeten? Bij een dier: door welk dier?
- Bij een mensenbeet: heeft de veroorzaker mogelijk besmettelijke ziekten? Zoals hiv, hepatitis B of C?
- Wanneer bent u voor het laatst gevaccineerd tegen tetanus?
- Kunt u de gewrichten rondom de wond goed bewegen?
- Heeft u uitbreidende roodheid, pijn, zwelling, warmte, vocht, pus of moeilijker bewegen bij de wond opgemerkt?

Hulpvraag patiënt

- Wat is voor u de reden van het contact?

Voorgeschiedenis

- Heeft u een verminderde afweer?

Medicatie

- Gebruikt u bloedverdunners?
- Gebruikt u medicatie die een verminderde afweer geeft?

Allergieën

- Bent u allergisch voor pijnmedicatie?
- Bent u allergisch voor povidonjodium (zoals Betadine) en pleisters?
- Bent u allergisch voor antibiotica?

Onderzoek (objectief)

Inspectie patiënt

ABCDE-check

- Let op een mogelijk probleem in de C.

Controles

- Meet bij een verdenking op een wondinfectie de lichaamstemperatuur.
- Verdere controles op indicatie.

Lichamelijk onderzoek

Beoordeel stapsgewijs deze negen punten:

- Locatie
- Diepte en grootte
- Wondranden
- Vascularisatie
- Kleur
- Kenmerken van infectie
- Schone/vuile wond
- Functie
- Sensibiliteit

Evaluatie

Werkdiagnose	• Bijtwond: een wond veroorzaakt door een beet van een mens of dier waarbij de huid kapot is.
Differentiaaldiagnose	• Er is geen differentiaaldiagnose bij een bijtwond.
ICPC-code	• S13 - Beet mens/dier

Plan

Overleg met de huisarts	• Bij ABCDE-problemen • Bij specifieke locaties • Verdenking op diepere beschadiging • Noodzaak wondtoilet • Hechten • Wondinfectie • Risicogroepen • Bijtwonden door bijzondere dieren • Bijtwonden door mensen met mogelijk of onbekende status hiv, HBV of HCV
Behandeling	Niet-medicamenteus • Reinigen • Verbinden • Wondtoilet Medicamenteus • Tetanus • Antibiotica • Pijnmedicatie Overig: sluiten bijtwond • Hechten of plakken
Informatie voor de patiënt	• Beantwoord de hulpvraag van de patiënt. • Geef uitleg over het beloop van bijtwonden. • Adviseer de patiënt hoe met de wond om te gaan: - Verschoon het verband elke dag. - Houd een gesloten wond 24 uur droog, daarna maximaal 10 minuten natmaken totdat hecht- of plakmateriaal verwijderd of eraf gevallen is. - Bescherm oppervlakkige bijtwonden minimaal drie maanden tegen UV-licht. • Verwijs de patiënt voor meer informatie over bijtwonden naar thuisarts.nl.
Controle/vervolg	• Controleer een bijtwond standaard na twee dagen vanwege de hogere kans op een wondinfectie. • Wanneer een wond gehecht is moet de patiënt terugkomen om de hechtingen te verwijderen.
Vangnetadviezen	Adviseer de patiënt contact op te nemen als: • Er kenmerken zijn van een wondinfectie en algemene ziekteverschijnselen. • De genezing onvoldoende is en dit niet past bij het normale beloop. • Er na twee dagen geen verbetering is van de genezing.

Dit protocol is gebaseerd op NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden, januari 2025.