Protocol
Tand door de lip



Anamnese (subjectief)

Algemene vragen Wat, waar, hoe, wanneer en waarom?	• Wat is er gebeurd? • Wanneer is het gebeurd? • Hoe is het gebeurd?
Specifieke vragen	• Zit uw tand los of bent u een (stukje) tand verloren? • Heeft u een kunstgebit? • Kunt u de onderkaak zonder pijn heen en weer bewegen? • Passen uw kaken goed op elkaar zoals u het gewend bent? • Wanneer bent u voor het laatst gevaccineerd tegen tetanus? • Heeft u ander letsel? • Bent u buiten bewustzijn geweest?
Hulpvraag patiënt	• Wat is voor u de reden van het contact?
Voorgeschiedenis	• Heeft u een verminderde afweer?
Medicatie	• Gebruikt u bloedverdunners? • Gebruikt u medicatie die een verminderde afweer geeft?
Allergieën	• Bent u allergisch voor pijnmedicatie? • Bent u allergisch voor povidonjodium (zoals Betadine) en pleisters? • Vraag specifiek naar allergieën voor antibiotica bij patiënten met een verminderde afweer.

Onderzoek (objectief)

Inspectie patiënt ABCDE-check	• Let bij hevig bloedende wonden en losse tanden of een kunstgebit op problemen in de A.
Controles	• Controles op indicatie.
Lichamelijk onderzoek	• Onderzoek tand door de lip - Mond - Lippen - Gebit - Kaak

Evaluatie

Werkdiagnose	• Tand door de lip: een trauma met een wond in de mond, lippen of huid rondom de lippen.
Differentiaaldiagnose	• Letsel aan de tanden • Letsel aan de kaak
ICPC-code	• D20 -Symptomen/klachten mond

Plan

Overleg met de huisarts	• ABCDE-problemen • Bewustzijnsverlies in de anamnese • Flauwvallen • Onduidelijkheid over hoe het trauma is ontstaan • Verdenking op problemen aan de kaak • Kind < 12 jaar • Inwendige wijkende wond >1 cm • Uitwendige scheurwond >0,5 cm of wijkende wondranden • Wond die vanuit het lippenrood naar de huid rondom de lippen doorloopt • Kenmerken van infectie
Behandeling	Niet-medicamenteus • Bloeding stelpen • Wond reinigen • Afwachtend beleid bij kleine wonden • Luxatie: verwijs met spoed naar de tandarts. • Avulsie: verwijs met spoed naar de tandarts. Medicamenteus • Tetanus • Antibiotica • Pijnmedicatie
Informatie voor de patiënt	• Beantwoord de hulpvraag van de patiënt. • Leg de patiënt uit dat wonden <1 cm in de mond en kleine wonden van het lippenrood binnen een aantal dagen genezen. • Verwijs de patiënt naar de tandarts bij afgebroken/losse/verloren tanden.
Controle/vervolg	• Niet van toepassing.
Vangnetadviezen	• Adviseer de patiënt contact op te nemen bij toename van pijn, warmte, zwelling, roodheid, pussende wond of koorts.