

Protocol

Tand door de lip



Anamnese (subjectief)

Algemene vragen

Wat, waar, hoe, wanneer en waarom?

- Wat is er gebeurd?
- Wanneer is het gebeurd?
- Hoe is het gebeurd?

Specifieke vragen

- Zit uw tand los of bent u een (stukje) tand verloren?
- Heeft u een kunstgebit?
- Kunt u de onderkaak zonder pijn heen en weer bewegen?
- Passen uw kaken goed op elkaar zoals u het gewend bent?
- Wanneer bent u voor het laatst gevaccineerd tegen tetanus?
- Heeft u ander letsel?
- Bent u buiten bewustzijn geweest?

Hulpvraag patiënt

- Wat is voor u de reden van het contact?

Voorgeschiedenis

- Heeft u een verminderde afweer?

Medicatie

- Gebruikt u bloedverdunners?
- Gebruikt u medicatie die een verminderde afweer geeft?

Allergieën

- Bent u allergisch voor pijnmedicatie?
- Bent u allergisch voor povidonjodium (zoals Betadine) en pleisters?
- Vraag specifiek naar allergieën voor antibiotica bij patiënten met een verminderde afweer.

Onderzoek (objectief)

Inspectie patiënt

ABCDE-check

- Let bij hevig bloedende wonden en losse tanden of een kunstgebit op problemen in de A.

Controles

- Controles op indicatie.

Lichamelijk onderzoek

- Onderzoek tand door de lip
 - Mond
 - Lippen
 - Gebit
 - Kaak

Evaluatie

Werkdiagnose

- Tand door de lip: een trauma met een wond in de mond, lippen of huid rondom de lippen.

Differentiaaldiagnose

- Letsel aan de tanden
- Letsel aan de kaak

ICPC-code

- D20 -Symptomen/klachten mond

Plan

Overleg met de huisarts

- ABCDE-problemen
- Bewustzijnsverlies in de anamnese
- Flauwvallen
- Onduidelijkheid over hoe het trauma is ontstaan
- Verdenking op problemen aan de kaak
- Kind < 12 jaar
- Inwendige wijkende wond >1 cm
- Uitwendige scheurwond >0,5 cm of wijkende wondranden
- Wond die vanuit het lippenrood naar de huid rondom de lippen doorloopt
- Kenmerken van infectie

Behandeling

Niet-medicamenteus

- Bloeding stelpen
- Wond reinigen
- Afwachtend beleid bij kleine wonden
- Luxatie: verwijs met spoed naar de tandarts.
- Avulsie: verwijs met spoed naar de tandarts.

Medicamenteus

- Tetanus
- Antibiotica
- Pijnmedicatie

Informatie voor de patiënt

- Beantwoord de hulpvraag van de patiënt.
- Leg de patiënt uit dat wonden <1 cm in de mond en kleine wonden van het lippenrood binnen een aantal dagen genezen.
- Verwijs de patiënt naar de tandarts bij afgebroken/losse/verloren tanden.

Controle/vervolg

- Niet van toepassing.

Vangnetadviezen

- Adviseer de patiënt contact op te nemen bij toename van pijn, warmte, zwelling, roodheid, pussende wond of koorts.